



# DOCTOR'S ORDER SHEET PRASAT HOSPITAL

## CAPD UNIT

หอผู้ป่วย.....

ชื่อ.....อายุ.....ปี HN.....นน.....kg. Dx.....การแพทย์.....

บัตรทอง     บัตรทอง ท     ชำระเงิน     เบิกต้นสังกัด     อื่นๆ.....

แพทย์..... นพ.กฤษฎี วีรชินโชติ.....

### Pre-Tenckhoff Catheter Implantation Order.

PROGRESS NOTE	Date	ORDERS FOR ONE DAY	ORDERS FOR CONTINUATION
<p>1. ESRD</p> <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้เริ่ม RRT</p> <p><input type="checkbox"/> Temporary HD via DLC.....</p> <p>ตั้งแต่วันที่.....</p> <p>2. U/D.....</p>		<p>- Admit อาคาร.....</p> <p><input type="checkbox"/> Set OR วางสาย Tenckhoff วันที่.....เวลา.....น.</p> <p><input type="checkbox"/> MAC      <input type="checkbox"/> Local anesthesia</p> <p><input type="checkbox"/> ให้ Cryoprecipitate 10 Unit IV. drip เวลา 06.30 น. วัน OR</p> <p><b>Pre-Implantation Order</b></p> <p><input type="checkbox"/> NPO AMN    <input type="checkbox"/> NPO หลังมือเช้า</p> <p><input type="checkbox"/> อาบน้ำและฟอกหน้าท้องด้วยสบู่ หรือ chlorhexidine เช้าวันผ่าตัด</p> <p><input type="checkbox"/> Lactulose 30 cc. po hs คื่นก่อนวันผ่าตัด</p> <p><input type="checkbox"/> Ativan (0.5) 1 tab po hs คื่นก่อนวันผ่าตัด</p> <p><input type="checkbox"/> NSS 1,000 ml0 IV.....mL/hr. เช้าวันผ่าตัด</p> <p><input type="checkbox"/> Cefazolin 1 gm. IV 1 ชม. ก่อนผ่าตัด</p> <p><input type="checkbox"/> Vancomycin 1 gm. IV 1 ชม. ก่อนผ่าตัด</p> <p><input type="checkbox"/> CXR, EKG</p> <p><input type="checkbox"/> CBC, PT, PTT, INR (if Plt &lt;100,000 PT, PTT Prolong please Notify นพ.กฤษฎี)</p> <p><input type="checkbox"/> BUN, Cr, E'lyte, Alb, Ca, PO4, HBsAg Anti HBs, Anti HCV, HIV</p> <p><input type="checkbox"/> เช้าก่อนผ่าตัดให้กินยา HT เดิม</p> <p><input type="checkbox"/> ผู้ป่วย DM ให้เจาะ DTX เวลา.....น.</p> <p><input type="checkbox"/> เบิก Heparin 5,000 u/ml. 1 Vial ไป OR</p>	<p>- Regular, low salt diet</p> <p>- Record V/S, I/O</p> <p>- Medication</p>
<p>นพ.กฤษฎี วีรชินโชติ ว.43564</p>		<p>นพ.กฤษฎี วีรชินโชติ ว.43564</p>	<p>นพ.กฤษฎี วีรชินโชติ ว.43564</p>

# DOCTOR'S ORDER SHEET PRASAT HOSPITAL

## CAPD UNIT

หอผู้ป่วย.....

ชื่อ.....อายุ.....ปี HN.....นน.....kg. Dx.....การแพทย์.....

บัตรทอง     บัตรทอง ท     ชำระเงิน     เบิกต้นสังกัด     อื่นๆ.....

แพทย์..... นพ.กฤษฎี วีรชินโชติ.....

### Post-Tenckhoff Catheter Implantation Order.

PROGRESS NOTE	Date	ORDERS FOR ONE DAY	ORDERS FOR CONTINUATION
Plan - Break in.....wks - Test flow วันที่..... - Discharge วันที่.....		<b>Post-Implantation Order</b> <input type="checkbox"/> Observe sign หน้าท้อง, Bleeding <input type="checkbox"/> Cefazolin 1 gm IV หลังผ่าตัด 12 ชม. <input type="checkbox"/> Vancomycin 1 gm IV หลังผ่าตัด 12 ชม. <input type="checkbox"/> เข้า.....ส่งผู้ป่วยและญาติ ไปที่ห้อง CAPD เพื่อ test flow + เรียน CAPD <input type="checkbox"/> Tramal 50 mg IV prn ทุก 8 ชม. <input type="checkbox"/> Pethidine .....mg IV prn ทุก 6 ชม. <input type="checkbox"/> Film KUB พรงนี้เข้า	<b>Post-Implantation Order</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ห้ามอาบน้ำและระวังไม่ให้เกิดแผลเปื่อยน้ำ</li> <li>● ไม่ต้องเปลี่ยนผ้าก๊อซ หรือทำแผล ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีเลือดซึมออกมาก</li> <li>- มีการติดเชื้อ</li> <li>- แผลแฉะ</li> <li>- บาดแผลหรือผ้าก๊อซสกปรก</li> </ul> </li> <li>● ระวังไม่ขยับหรือรั้งสาย Tenckhoff Catheter</li> <li>● Regular, low salt diet</li> <li>● Record V/S, I/O</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Medication</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Paracetamol (500) 1 tab po prn ทุก 6 ชม.</li> <li><input type="checkbox"/> Hema-plus (สนับสนุน) 4,000 I.U. sc ๓ วัน.....</li> <li><input type="checkbox"/> Espogen (สนับสนุน) 4,000 I.U. sc ๓ วัน.....</li> <li><input type="checkbox"/> ยาเดิมผู้ป่วย</li> </ul>
นพ.กฤษฎี วีรชินโชติ ว.43564		นพ.กฤษฎี วีรชินโชติ ว.43564	นพ.กฤษฎี วีรชินโชติ ว.43564

Date of operation.....Time started.....Time end.....  
 Surgeon.....**นพ.กฤษฎี วีรชินโชติ**.....First assistant.....  
 Second assistant.....Surgical nurse.....  
 Clinical diagnosis.....**End-stage renal disease**.....  
 Post operation diagnosis.....**End-stage renal disease with post-Tenckhoff catheter insertion**.....  
 Operation.....**Tenckhoff catheter insertion by modified Seldinger technique**.....  
 Anesthetic techniques.....**Local anesthesia**.....Anesthesiologist.....**นพ.กฤษฎี วีรชินโชติ**.....


DESCRIPTIVE OF OPERATION

Position: **Supine**

Incision: **Horizontal incision was made 2.0 cm below umbilicus**

Procedure:

- After sterile preparation, local anesthesia (1%lidocaine 10 ml) was administered by subcutaneous infiltration.
- A 2.5 cm horizontal incision was made 2.0 cm below umbilicus.
- The subcutaneous tissue was blunt-dissected up to the peritoneum.
- An introducer needle was implanted toward the pelvis (0.5 cm beyond the depth of abdominal wall).
- Normal saline (25 ml.) was administrated through the introducer needle to ensure that the needle had entered the peritoneal cavity.
- A guidewire was inserted through the needle into the deep pelvis.
- The needle was removed, and the dilator with a peel-away sheath was inserted over the guidewire.
- The guidewire and dilator were removed, leaving the sheath in place.
- The Tenckhoff catheter was threaded onto a stiffening stylet and advanced through the sheath into the deep pelvis while withdrawing the stiffening stylet until the deep cuff was overcropped.
- Using the curved clamp for tunnel creation, the catheter was directed laterally to the right side, and an exit side was created 3.0 cm below placement site.
- Placing proximal cuff below the skin, 3.0 cm from the exit site, and subumbilical incision was closed.



Estimate blood loss.....ml.

Urine output.....ml.

- ส่ง Patho     ไม่ส่ง Patho     Clean wound     Clean contaminate wound  
 Contaminate wound     Dirty wound

Name	Age	Hospital number
Department	Ward	Signature <b>นพ.กฤษฎี วีรชินโชติ</b>