โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลปราสาท	แบบฟอร์ม (Form : FM) รหัส **FM-PCTPED-003-00**

เรื่อง : Standing order for Birth before arrival (ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลปราสาท)

ชื่อหน่วยงาน : PCT กุมารเวชกรรม	**ฉบับแรก** (จำนวน 2 หน้ารวมปก) **วันที่อนุมัติใช้** 12 ก.ค. 2564

ผู้จัดทำ	**ตำแหน่ง**	**ลายมือชื่อ**
นางสาวปิยดา พรใหม่	นายแพทย์ชำนาญการ	ปิยดา

ผู้ตรวจสอบ ปิยดา (นางสาวปิยดา พรใหม่) ประธาน PCT กุมารเวชกรรม	**ผู้อนุมัติ** สมภพ (นายสมภพ สารวนางกูร) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท

หน่วยงานที่นำไปใช้

1) กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
2) กลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด
3) กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยสูติ-นรีเวช
4) หออภิบาลทารกแรกเกิดป่วยและวิกฤติ
5) กลุ่มงานการพยาบาลตึกพิเศษ (ชั้น5)

การควบคุมระบบเอกสารคุณภาพ

ประวัติการแก้ไข :

ครั้งที่	วันที่อนุมัติใช้	รายละเอียดการแก้ไข	เลขหน้า
00	12 ก.ค. 2564	ประกาศใช้ทั้งฉบับ	1-2

Standing order for Birth before arrival (ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลปราสาท)

Date/ Time	Order for one day	Date/ Time	Order for continuation
	☐ ประเมินความจำเป็นในการกู้ชีพทารก(NCPR) ☐ ให้ทารกอยู่ใต้ radiant warmer (air mode) set อุณหภูมิที่ 35 °C **(Keep BT 36.5-37.5 °C, RR40-60 /min, HR 100-160 bpm, capillary refill ≤ 2 sec, SpO2 ≥95%)** ☐ V/S ทุก 15-30 min at ER และก่อนย้ายทารก ☐ **ถ้า RR > 60/min หรือหายใจมี grunting/retraction** **On O2 BOX 5 LPM รายงานแพทย์** ☐ DTX, Hct. stat **(Keep DTX 50-110 mg%)** **<u>ถ้า DTX < 50 mg% *ส่งตรวจ Blood glucose เพิ่ม</u>** • **ทารกไม่มีอาการ:** 10% DW (TV 65 ml/kg/day) IV.....ml./hr. • **ทารกมีอาการ :** 10%DW(2ml./kg.)..... ml IV push then (GIR 6 mg./kg./min)IV.....ml/hr. ☐ DTX ซ้ำอีก 30 นาที และก่อนย้ายทารก ☐ NPO ไว้ก่อน ☐ ตัดสายสะดือใหม่ด้วย sterile technique ☐ แจ้ง Staff เวรเด็ก ก่อน admit ☐ Admit Nursery/Postpartum ward ☐ Transfer ทารกด้วย transport incubator (set อุณหภูมิไว้ที่ 34 °C) ลงชื่อ.....		☐ NPO ไว้ก่อน ☐ V/S q 30 min until stable then as usual ☐ Routine newborn care ☐ BW OD Medication .... *พิจารณาให้ยาปฏิชีวนะ(เฉพาะกรณี unsterile cord cut/unsterile delivery) ➢ PGS 200,000 u/kg/day IV q 12 hr. ➢ Gentamicin 4 mg/kg/day IV q 24 hr. ****ส่งตรวจ CBC, Hemoculture ก่อนให้ ATB**** ลงชื่อ.....

การป้องกัน Neonatal tetanus พิจารณาดังนี้

กรณี	TIG 250 unit IM
มารดาไม่ได้ TT ระหว่างตั้งครรภ์ และ unsterile cord cut	ให้
มารดาได้รับ TT ≥ 2 ครั้งระหว่างตั้งครรภ์(doseสุดท้าย ≥1 เดือน) และ unsterile cord cut	ไม่ให้
มารดาไม่ได้รับ TT และ sterile cord cut	ไม่ให้