



# ข้อควรรู้สำหรับผู้รับบริการ ฉีดวัคซีนโควิด 19

## ก่อนฉีดวัคซีน

### ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว

หากกินยาประจำ ควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนได้รับวัคซีน



### ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจ อัมพฤกษ์ และอัมพาต

ไม่ควรหยุดยาเพื่อฉีดวัคซีน ยกเว้นกรณีที่แพทย์แนะนำให้หยุดยาชั่วคราว เพื่อให้ผลลัพธ์ของวัคซีนมีความแม่นยำ

### ผู้ที่เป็โรคเลือดออกง่าย

ต้องแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนรับการฉีดวัคซีนเพราะอาจต้องใช้เวลากดแผลบริเวณที่ฉีดให้นานขึ้น ถ้าหลังฉีดวัคซีนมีอาการห้อเลือดหรือจ้ำเลือดขึ้นควรพบแพทย์

## หลังฉีดวัคซีน

### ถ้ามีไข้สูงเกิน 38° C

ปวดเมื่อยหรืออ่อนเพลียมาก ควรกินพาราเซตามอล 1 เม็ด แต่ให้หลีกเลี่ยงยาแก้ปวดชนิดแรงแง เช่น แอสไพริน ซึ่งอาจไปกดระบบตอบสนองของร่างกาย ทำให้วัคซีนตอบสนองได้ลดลง

### ผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว

หากมีอาการของโรคกำเริบ ให้รีบมาปรึกษาแพทย์ทันที ไม่ว่าจะอาการนั้นจะเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนหรือไม่ก็ตาม

อาจเกิดผลข้างเคียงหลังจากฉีดวัคซีน เช่น ปวดแขน บวมบริเวณที่ฉีด มีไข้ต่ำๆ ปวดเมื่อยตัว หรือ อ่อนเพลีย สาเหตุอาจเป็นเพราะร่างกายตอบสนองต่อวัคซีน

