




## แนวปฏิบัติในกรณีผู้ป่วยได้รับยาต้านเกร็ดเลือด (Antiplatelets), ยาละลายลิ่มเลือด (Anticoagulant) และทำหัตถการทางทันตกรรม

### 1. ยาต้านเกร็ดเลือด (Antiplatelets)

- กรณีผู้ป่วยได้ยา Aspirin ชนิดเดี่ยว ทั้งใน Primary prevention for CVD เช่น ในผู้ป่วยเบาหวาน หรือเป็น Secondary prevention for CVD เช่น ผู้ป่วย Ischemic stroke และ CAD สามารถทำหัตถการได้โดยไม่ต้องหยุด ASA **ยกเว้น** ในกรณีที่เป็นการทำหัตถการทางทันตกรรมที่มีความเสี่ยงสูง และเป็น Primary prevention for CVD ทันตแพทย์สามารถพิจารณาหยุด ASA ก่อนทำหัตถการ 7 วัน

- กรณีได้ Clopidogrel, Dipyridamole, Prasugrel หรือ Ticagrelor ชนิดเดี่ยวหรือร่วมกับ ASA (Dual antiplatelets) สามารถทำหัตถการได้โดยไม่ต้องหยุด และพิจารณา Local bleeding control ร่วมด้วย

### 2. Warfarin



#### หมายเหตุ :

- ทันตแพทย์สามารถสั่งตรวจ INR ได้โดยไม่ต้องผ่านอายุรแพทย์ หากอยู่ในช่วงที่เหมาะสมสามารถทำหัตถการได้
- พยาบาลคัดกรองสามารถพิจารณา ส่งตรวจ INR ในผู้ป่วยที่ on Warfarin และต้องทำหัตถการทางทันตกรรมก่อนปรึกษาอายุรแพทย์

(หากจะใช้ผลตรวจ INR เดิม ต้องอยู่ในช่วง 1-3 วันก่อนทำหัตถการเท่านั้น)

3. ยากลุ่ม Direct oral anticoagulant (DOAC) เช่น Apixaban (Eliquis), Dabigatran (Pradaxa), Rivaroxaban (Xarelto) และ Edoxaban (Lixiana)
- แนะนำให้ทำหัตถการหลังกินยา DOAC 18-24 ชั่วโมง และทำหัตถการในช่วงเช้า
  - Apixaban (Eliquis) และ Dabigatran (Pradaxa) รับประทานวันละ 2 ครั้ง ให้งดยาเมื่อเย็นก่อนวันทำหัตถการ และยังไม่ต้องรับประทานยามื้อเช้าวันทำหัตถการ
  - Rivaroxaban(Xarelto) และ Edoxaban (Lixiana) รับประทานวันละครั้ง ยังไม่ต้องรับประทานยาเช้าวันทำหัตถการ
  - หลังทำหัตถการ 6 ชั่วโมงถ้าไม่มีภาวะเลือดออกรุนแรง สามารถกินยา DOAC ได้ตามปกติ

**การจำแนกความเสี่ยงทางทันตกรรม**

| *Low risk of post-operative bleeding complications         | **Higher risk of post-operative bleeding complications                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Simple extractions (1-3 teeth, with restricted wound size) | Complex extractions, adjacent extractions that will cause a large wound or more than 3 extractions at once                                                                                                                                                                    |
| Incision and drainage of intra-oral swellings              | Flap raising procedures:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Elective surgical extractions</li> <li>- Periodontal surgery</li> <li>- Preprosthetic surgery</li> <li>- Periradicular surgery</li> <li>- Crown lengthening</li> <li>- Dental implant surgery</li> </ul> |
| Detailed six point full periodontal examination            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Root surface instrumentation (RSI) and subgingival scaling |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Direct or indirect restorations with subgingival margins   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                            | Gingival recontouring                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                            | Biopsies                                                                                                                                                                                                                                                                      |

อ้างอิง : Management of Dental Patients Taking Anticoagulants or Antiplatelet Drugs หน้า 6