


หากท่านมีอาการ ท้องเสีย อาเจียน
แต่ **ปัสสาวะออกปกติ**



ให้หยุดยาจนกว่าอาการจะดีขึ้น
แล้วกลับมาทานยาตามปกติ



หากผู้ป่วยมีข้อสงสัยหรือข้อสอบถามเพิ่มเติม สามารถ
ติดต่อสอบถามได้ที่

โรงพยาบาลปราสาท เบอร์โทร 044-511295



ผู้เรียบเรียง : นางสาววรรษชล วลามิตร (เภสัชกร)

บรรณาธิการ : นางอริสา แสงเพ็ง (เภสัชกรชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม)

อ้างอิง : รจนา จักรเมธากุล. ภาวะเลือดเป็นกรดแลคติกเกิน
ซึ่งสัมพันธ์กับการใช้ยาเมทฟอร์มิน : วารสารสมาคมเวช
ศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย. 2561;8:147-151

จดหมายข่าวสารด้านยา

ฉบับที่ 4/2564



ภาวะเลือดเป็นกรดจากยาเบาหวาน
“เมท-ฟอร์มิน”

ด้วยความปรารถนาดีจาก...
โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ยาเมทฟอร์มินคืออะไร?

เมทฟอร์มิน (Metformin) เป็นยาในกลุ่ม Biguanides หรือ Insulin sensitizer มีประสิทธิภาพในการลดน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โดยจะไปลดการสร้างน้ำตาลที่ตับ สามารถลดระดับกรดไขมันอิสระในพลาสมาได้ และช่วยเพิ่มความไวต่ออินซูลิน รวมทั้งลดการดูดซึมน้ำตาลที่บริเวณลำไส้ด้วย แพทย์มักจะเลือกใช้เป็นตัวแรกในการรักษาเบาหวาน

ภาวะเลือดเป็นกรด คืออะไร

ภาวะเลือดเป็นกรดจากเมทฟอร์มิน (Metformin-associated lactic acidosis : MALA) เป็นหนึ่งในอาการที่ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาเมทฟอร์มิน โดยอุบัติการณ์ของภาวะนี้ค่อนข้างต่ำ แต่หากเกิดแล้วอาการรุนแรงอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ โดยอาการของภาวะเลือดเป็นกรด ได้แก่

- ผู้ป่วยรู้สึกไม่สบาย มีอาการหายใจเร็ว
- ความดันต่ำ
- คลื่นไส้ มึนงง



ใครบ้าง...ที่เสี่ยงต่อการเกิดภาวะเลือดเป็นกรดจากยาเมทฟอร์มิน

คนที่ทานยาเมทฟอร์มิน ร่วมกับ...



เหล้า



ยาสมุนไพร



ยาชุด



ยาแก้ปวดลดอักเสบ (NSAIDS)

หากท่านใช้ยาเมทฟอร์มิน และมีอาการ 2 ใน 3 ข้อ

1. ท้องเสีย อาเจียน มากกว่า 2 ครั้ง



2. หายใจหอบเหนื่อย



3. ปัสสาวะน้อยกว่าปกติ



ควรหยุดยา !!!
รีบไปโรงพยาบาลทันที