

ข้อควรพิจารณาในการฉีดผู้ป่วย กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด

♥ ในผู้ป่วยเพิ่มมีอาการหรืออาการไม่คงที่ เช่น ผู้ป่วยที่มีอาการของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบชนิด เจ็บพลันหรือภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน ให้ รอนกว่าอาการดีขึ้นและคงที่จึงจะฉีดวัคซีน

♥ ในผู้ป่วย ความดันโลหิตสูง SBP >160mmHg ควรควบคุมความดันโลหิตให้ดี ก่อนฉีดวัคซีน

♥ ในผู้ป่วยที่รับประทานยา warfarin ควรมี INR มากกว่า 3 ส่วนผู้ป่วยที่รับประทานยา กลุ่ม NOAC และยาต้านเกล็ดเลือด เช่น aspirin, clopidogrel, ticagrelor สามารถฉีดได้ ควรใช้ เข็ม 23G หรือเล็กกว่า ไม่คลึงกล้ามเนื้อบริเวณที่ ฉีด ควรกดตำแหน่งที่ฉีดหลังการฉีดอย่างน้อย 2 นาที และแน่ใจว่าไม่มีเลือดออกผิดปกติ

ข้อควรพิจารณาในการฉีดผู้ป่วย กลุ่มโรคไต

ปัจจุบันยังไม่มีผลการศึกษาถึงประสิทธิภาพ ของวัคซีนแบบเฉพาะเจาะจงในกลุ่มผู้ป่วยดังกล่าว แต่คาดว่า การฉีดวัคซีนยังมีประโยชน์ช่วยลด อัตราการเสียชีวิตและความรุนแรงของโรคได้ จึง ยังแนะนำให้ได้รับการฉีดวัคซีน

หากอาการข้างเคียงที่รุนแรงดังต่อไปนี้ ให้พบแพทย์ทันที

ไข้สูง

ปวดศีรษะ
รุนแรง

แสบ
หน้าอก
หายใจ
ไม่ออก

ปากเขียว
กล้ามเนื้อ
อ่อนแรง

พื่นขึ้น
ทั่วตัว

อาเจียน
> 5 ครั้ง

มีจุดเลือดออก
จำนวนมาก

ชัก/หมดสติ



เพื่อติดตามอาการ
ไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีน

เอกสารอ้างอิง: คณะแพทยศาสตร์, คู่มือวัคซีนโควิดสำหรับ ประชาชน สสส., ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐ (CDC)
ผู้เรียบเรียง: นางสาววิชญา สำนักนิติ (เภสัชกรปฏิบัติการ)
บรรณาธิการ: นางอรวิสา แสงเพ็ญ (เภสัชกรชำนาญการ หัวหน้า กลุ่มงานเภสัชกรรม)

จดหมายข่าวสารด้านยา

ฉบับที่ 3/2564

การให้บริการ ฉีดวัคซีนโควิด 19



ด้วยความปรารถนาดี
จาก.. กลุ่มงานเภสัชกรรม
โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ขั้นตอนการรับบริการ

1

คัดกรอง วัดไข้ ล้างมือ
ก่อนเข้ารับบริการ



2

ลงทะเบียน (ทำบัตร)

3

ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต



4

คัดกรอง/ซักประวัติ
ประเมินความเสี่ยง

5

รอฉีดวัคซีน

6

ฉีดวัคซีน



7

พักสังเกตอาการ 30 นาที
แอสกน Line account



8

จุดตรวจสอบก่อนกลับพร้อมรับ
เอกสารการปฏิบัติตัวหลังฉีด



ใช้เวลา 40 นาที/คน

Line หมอพร้อม

- ติดตามวัคซีนหลังฉีด 1 วัน, 7 วัน, 30 วัน
- แจ้งนัดหมายฉีดครั้งที่ 2
- รับผิดชอบต่อผลการฉีดวัคซีน



ข้อควรรู้สำหรับผู้รับบริการ ฉีดวัคซีนโควิด 19

ก่อนฉีดวัคซีน

ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว

หากกินยาประจำ ควรแจ้งให้แพทย์
ทราบก่อนได้รับวัคซีน



ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน ความดัน โลหิตสูง หัวใจล้มเหลว และอัมพาต

ไม่ควรหยุดยาเพื่อฉีดวัคซีน ยกเว้น
กรณีที่แพทย์แนะนำให้หยุดยาชั่วคราว
เพื่อให้ผลลัพธ์ของวัคซีนมีความแม่นยำ



ผู้ที่เป็นโรคเลือดออกง่าย



แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนรับการฉีด
วัคซีนเพราะอาจต้องใช้เวลากดแผลบริเวณ
ที่ฉีดให้นานขึ้นถ้าหลังฉีดวัคซีนมีอาการ
ห้อเลือดหรือจ้ำเลือดขึ้น ควรพบแพทย์

หลังฉีดวัคซีน

ถ้ามีไข้สูงเกิน 38° C



ปวดเมื่อยหรืออ่อนเพลียมาก ควรกิน
พาราเซตามอล 1 เม็ด แต่ให้หลีกเลี่ยงยาแก้
ปวดชนิดแรงแซง เช่น ยาแอสไพริน ซึ่งอาจไป
กดระบบตอบสนองของร่างกายทำให้วัคซีน
ตอบสนองได้ลดลง

ผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว

หากมีอาการของโรคกำเริบ ให้รีบมา
ปรึกษาแพทย์ทันที ไม่ว่าจะอาการนั้นจะ
เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนหรือไม่ก็ตาม



อาจเกิดผลข้างเคียงหลังจากฉีดวัคซีน
เช่น ปวดแขน บวมบริเวณที่ฉีด มีไข้ต่ำๆ
ปวดเมื่อยตัว หรือ อ่อนเพลีย สาเหตุอาจ
เป็นเพราะร่างกายตอบสนองต่อวัคซีน