

Standing order for Birth before arrival (ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลปราสาท)

Date/ Time	Order for one day	Date/ Time	Order for continuation								
	<p><input type="checkbox"/> ประเมินความจำเป็นในการกู้ชีพทารก(NCPR)</p> <p><input type="checkbox"/> ให้ทารกอยู่ที่ radiant warmer (air mode) set อุณหภูมิที่ 35 °C</p> <p>(Keep BT 36.5-37.5 °C, RR40-60 /min, HR 100-160 bpm, capillary refill ≤ 2 sec, SpO2 ≥95%)</p> <p><input type="checkbox"/> V/S ทุก 15-30 min at ER และก่อนย้ายทารก</p> <p><input type="checkbox"/> ถ้า RR > 60/min หรือหายใจมี grunting/retraction</p> <p>On O2 BOX 5 LPM รายงานแพทย์</p> <p><input type="checkbox"/> DTX, Hct. stat (Keep DTX 50-110 mg%)</p> <p>ถ้า DTX < 50 mg% *ส่งตรวจ Blood glucose เพิ่ม</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ทารกไม่มีอาการ: 10% DW (TV 65 ml/kg/day) IV.....ml/hr. ● ทารกมีอาการ : 10%DW(2ml./kg.)..... ml IV push then (GIR 6 mg./kg./min)IV.....ml/hr. <p><input type="checkbox"/> DTX ซ้ำอีก 30 นาที และก่อนย้ายทารก</p> <p><input type="checkbox"/> NPO ไว้ก่อน</p> <p><input type="checkbox"/> ตัดสายสะดือใหม่ด้วย sterile technique</p> <p><input type="checkbox"/> แจ้ง Staff เวนเด็ก ก่อน admit</p> <p><input type="checkbox"/> Admit Nursery/Postpartum ward</p> <p><input type="checkbox"/> Transfer ทารกด้วย transport incubator (set อุณหภูมิไว้ที่ 34 °C)</p> <p>ลงชื่อ.....</p>		<p><input type="checkbox"/> NPO ไว้ก่อน</p> <p><input type="checkbox"/> V/S q 30 min until stable then as usual</p> <p><input type="checkbox"/> Routine newborn care</p> <p><input type="checkbox"/> BW OD</p> <p>Medication</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>*พิจารณาให้ยาปฏิชีวนะ(เฉพาะกรณี unsterile cord cut/unsterile delivery)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ PGS 200,000 u/kg/day IV q 12 hr. ➤ Gentamicin 4 mg/kg/day IV q 24 hr. <p>**ส่งตรวจ CBC, Hemoculture ก่อนให้ ATB**</p> <p>ลงชื่อ.....</p>								
<p>การป้องกัน Neonatal tetanus พิจารณาดังนี้</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">กรณี</th> <th style="width: 30%;">TIG 250 unit IM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>มารดาไม่ได้ TT ระหว่างตั้งครรภ์ และ unsterile cord cut</td> <td style="text-align: center;">ให้</td> </tr> <tr> <td>มารดาได้รับ TT ≥ 2 ครั้งระหว่างตั้งครรภ์(doseสุดท้าย ≥1 เดือน) และ unsterile cord cut</td> <td style="text-align: center;">ไม่ให้</td> </tr> <tr> <td>มารดาไม่ได้รับ TT และ sterile cord cut</td> <td style="text-align: center;">ไม่ให้</td> </tr> </tbody> </table>				กรณี	TIG 250 unit IM	มารดาไม่ได้ TT ระหว่างตั้งครรภ์ และ unsterile cord cut	ให้	มารดาได้รับ TT ≥ 2 ครั้งระหว่างตั้งครรภ์(doseสุดท้าย ≥1 เดือน) และ unsterile cord cut	ไม่ให้	มารดาไม่ได้รับ TT และ sterile cord cut	ไม่ให้
กรณี	TIG 250 unit IM										
มารดาไม่ได้ TT ระหว่างตั้งครรภ์ และ unsterile cord cut	ให้										
มารดาได้รับ TT ≥ 2 ครั้งระหว่างตั้งครรภ์(doseสุดท้าย ≥1 เดือน) และ unsterile cord cut	ไม่ให้										
มารดาไม่ได้รับ TT และ sterile cord cut	ไม่ให้										