


<p>โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์</p>		<p>ระเบียบปฏิบัติ (System Procedure:SP) เลขที่ <b>SP-CLT-HIVSTI-002</b></p>
<p>เรื่อง: แนวทางการค้นหากลุ่มเสี่ยงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอชไอวีในผู้ป่วยที่Admit</p>		
<p>จัดทำโดย: คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพพรายโรค HIV STI</p>	<p>ฉบับแรก (จำนวน 2 หน้า รวมปก) ประกาศใช้เมื่อ: <b>25 ม.ค. 2561</b></p>	
<p>หน่วยงานนำไปใช้: ทุกหน่วยงาน</p>		

*ศรีสุดา*

(นางสาวศรีสุดา มานูจำ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอกอายุรกรรม

*วันทนี มามูล*

(นางวันทนี มามูล)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ประธาน PCT อายุรกรรม

*[Signature]*

(นายประมวล ไทยงามศิลป์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท

**25 ม.ค. 2561**

## แนวทางการค้นหาากลุ่มเสี่ยงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอชไอวีในผู้ป่วยที่ Admit

1. ผู้ที่มีอาการหรืออาการแสดงที่เข้าได้กับการติดเชื้อเอชไอวีหรือเอดส์ ดังต่อไปนี้

- ผู้ที่มีน้ำหนักลดมากกว่า 10% ของน้ำหนักเดิมภายในเวลา 1 เดือน
- ผู้ที่มีร่องร่วงเรื้อรังมากกว่า 1 เดือน (Cryptosporidiosis, Isosporiasis)
- ผู้ป่วยวัณโรค
- ผู้ป่วยเยื่อหุ้มสมอง/สมองอักเสบ
- ผู้ที่มีเชื้อราในปากเรื้อรัง หรือติดเชื้อราในตำแหน่งที่พบไม่บ่อย เช่น หลอดอาหารหลอดลมหรือปอด เป็นต้น
- ผู้ป่วย invasive cervical cancer
- ผู้ป่วยเริ่มที่มีแผลเรื้อรังมากกว่า 1 เดือน
- ผู้ป่วยที่จอประสาทตาอักเสบ สงสัยการติดเชื้อ Cytomegalovirus
- ผู้ป่วย Kaposi's sarcoma
- ผู้ป่วย lymphoma
- ผู้ป่วยที่มีไข้เรื้อรัง ไอแห้งๆ และเหนื่อยหอบมากขึ้น สงสัย Pneumocystis pneumonia
- ผู้ป่วย recurrent pneumonia
- ผู้ป่วยที่มีไข้เรื้อรัง น้ำหนักลด อ่อนเพลีย ท้องร่วงเรื้อรัง ต่อม้ำเหลืองอักเสบ หรือมีการติดเชื้อแพร่กระจายตามอวัยวะต่างๆเช่น ไช้กระดูก ตับ ต่อม้ำเหลือง สงสัยการติดเชื้อ Mycobacterium avium complex (MAC)
- ผู้ป่วย Salmonella septicemia
- ผู้ป่วยที่มีอาการปวดศีรษะ แขนขาอ่อนแรง ชัก ซึม สับสน ตรวจพบ brain tumor สงสัยการติดเชื้อ Toxoplasmosis
- ผู้ป่วยที่สงสัยภาวะ Cryptococcosis, Coccidiomycosis, Histoplasmosis, Penicilliosis

2. ผู้ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ได้แก่ ซิฟิลิส หนองใน กามโรคต่อมและท่อน้ำเหลือง หนองในเทียม แผลริมอ่อน เริ่มที่อวัยวะเพศและทวารหนัก หูดหนองไก่ หูดข้าวสุก อู้งเชิงกรานอักเสบ/ปีกมดลูกอักเสบ ช่องคลอดอักเสบ/แบคทีเรียวาลินซิส

3. ผู้ป่วยในที่ต้องผ่าตัดหรือทำหัตถการในห้องผ่าตัดทุกราย
4. ผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีดและใช้เข็มร่วมกัน
5. ทารกที่เกิดจากมารดาติดเชื้อเอชไอวี
6. บุคลากรทางการแพทย์ที่เกิดอุบัติเหตุที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี
7. ผู้ถูกกล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหาทางเพศ
8. ผู้ที่ต้องการตรวจเลือดก่อนแต่งงานหรือผู้ที่วางแผนมีบุตร
9. ผู้ที่มีภาวะแท้งที่ไม่ได้รับการฝากครรภ์
10. ผู้ป่วยที่ได้รับเลือดหรือเปลี่ยนถ่ายเลือดเป็นประจำ เช่น ผู้ป่วยธาลัสซีเมีย ผู้ป่วยโรคไต เป็นต้น
11. ประชากรกลุ่มเสี่ยง เช่น MSM FSW Migrant เป็นต้น
12. ผู้ผลเลือดต่าง/คู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวี
13. ผู้ป่วยติดสุรา/มีภาวะถอนพิษสุรา
14. ผู้ป่วย admit ด้วยปัญหาสุขภาพจิต