



<p>โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์</p>		<p>ระเบียบปฏิบัติ (System Procedure:SP) เลขที่ SP-CLT-HIVSTI-020</p>
<p>เรื่อง: แนวทางปฏิบัติเมื่อผล Anti - HIV Inconclusive (สรุปผลไม่ได้)</p>		
<p>จัดทำโดย: คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพพรายโรค HIV STI</p>	<p>ฉบับแรก (จำนวน 2 หน้า รวมปก) ประกาศใช้เมื่อ: 25 ม.ค. 2561</p>	
<p>หน่วยงานนำไปใช้: ทุกหน่วยงาน</p>		



(นางสาวแวนเพชร ธิบเร่งดี)

นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา



(นางวันทนีย์ มามูล)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ประธาน PCT อายุรกรรม




(นายประมวล ไทยงามศิลป์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท

25 ม.ค. 2561

แนวทางปฏิบัติเมื่อผล Anti - HIV Inconclusive (สรุปผลไม่ได้)



- รายงานผล Inconclusive (สรุปผลไม่ได้) Lab โทรแจ้งค่าวิกฤติหน่วยงานต้นสังกัดของคนไข้และแจ้งขอเลือดใหม่ใส่ Tube EDTA 3-5 ml. *กรณี ANC ให้แยกจาก Tube CBC กรณีไม่มีตรวจหรือต้องส่งตรวจ Hb typing ให้แจ้งส่งเสริมเพื่อนัดคนไข้มาเจาะเลือดใหม่
- Lab ปั่นแยก Serum เพื่อตรวจ HIV Ag, Anti-HIV และ แยก Plasma เพื่อตรวจ HIV 1 RNA (Qualitative) เก็บที่อุณหภูมิ 2-8 องศา
- จัดบันทึกค่าวิกฤติในรูปแบบบันทึกค่าวิกฤติงานภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกและจัดบันทึกลงทะเบียน lab ส่งต่อศูนย์แล็บเอกชน
- (1) แนวทางการวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีทางห้องปฏิบัติการสำหรับผู้ใหญ่และเด็กที่มีอายุ 24 เดือนขึ้นไป ตามแนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีประเทศไทย 2560
- (2) ควรติดตามผู้รับบริการมาตรวจซ้ำภายใน 2 สัปดาห์และ/หรือ 1 เดือน ตามลำดับ ตามแนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีประเทศไทย 2560
- (3) HIV Ag , Anti-HIV รอผล 3-5 วันทำการ *กรณี LR/หลังคลอดขอผลด่วนภายใน 16.00 น. ของวันถัดไป ยกเว้นวันหยุด ศูนย์แล็บฯหยุดรับส่งตรวจ
- (4) HIV 1 RNA (Qualitative) ส่งตรวจต่อ รพ.ศิริราช หรือ รพ.รามฯ รอผล 10-15 วันทำการ